

DE Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte und neo-angin forte orange

Was ist neo-angin und wann wird es angewendet?

neo-angin Lutschtabletten enthalten eine Wirkstoffkombination von Cetylpyridin und Lidocain. Während Cetylpyridin für die keimtötende Wirkung der Lutschtablette verantwortlich ist, lindert Lidocain Schmerzen der Schleimhäute der Mundhöhle, des Rachens und des Kehlkopfes. neo-angin wird unterstützend bei Entzündungen im Bereich der Mund- und/oder Rachenhöhle sowie des Kehlkopfes, sowie zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen beim Schlucken und bei Heiserkeit angewendet. Bei zahnärztlichen oder chirurgischen Eingriffen kann neo-angin auf ärztliche Verordnung hin ebenfalls eingenommen werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Hinweis für Diabetiker: Diese Arzneimittel enthalten 2.5 g verwertbare Kohlenhydrate pro Lutschtablette und sind für Diabetiker geeignet.

Wann darf neo-angin nicht eingenommen werden?

Bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe oder gegen andere örtliche Betäubungsmittel (Lokalanästhetika). Bei Patienten, die auf Azofarbstoffe, Acetylsalicylsäure sowie Rheuma- und Schmerzmittel (Prostaglandinhemmer) überempfindlich reagieren.

Wann ist bei der Einnahme von neo-angin Vorsicht geboten?

Bei blutenden Wunden in der Schleimhaut soll die Lutschtablette – wenn überhaupt – mit Vorsicht eingenommen werden, da die Aufnahme der Wirkstoffe ins Blut erhöht sein kann. Dies gilt insbesondere bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Störungen oder Krampfleidung. Bei eingeschränkter Leber- und/oder Nierenfunktion, da diese Einschränkungen zu erhöhten Wirkstoffkonzentrationen im Blut führen können. Bei Kindern unter 12 Jahren wird neo-angin forte nicht empfohlen. Bei Kindern unter 6 Jahren werden neo-angin und neo-angin junior nicht empfohlen. Bei höherem Fieber oder wenn innerhalb von 3 Tagen keine Besserung eintritt, ist ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. **Hilfsstoffe:** Neo-angin junior, neo-angin forte orange und neo-angin Lutschtabletten enthalten Azofarbstoffe, welche allergische Reaktionen hervorrufen können (siehe auch unter «Wann darf neo-angin nicht eingenommen werden?»). Neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte und neo-angin forte orange, Lutschtabletten enthalten Isomalt. Bitte nehmen Sie neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte und neo-angin forte orange, Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Der Kalorienwert beträgt 2.3 kcal/g Isomalt. Neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte und neo-angin forte orange, Lutschtabletten können bei mehrmaliger täglicher Einnahme eine leicht abführende Wirkung haben. Neo-angin junior, neo-angin und neo-angin forte orange, Lutschtabletten enthalten Alkohol (Ethanol). Die geringe Alkoholmenge in diesen Arzneimitteln hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen. Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen. Neo-angin junior und neo-angin forte orange, Lutschtabletten enthalten einen Duftstoff mit den Allergenen Citral, Linalool, D-Limonen, Benzylbenzoat, Benzylcinnamat und Geraniol. Neo-angin, Lutschtabletten enthalten einen Duftstoff mit den Allergenen Citral, D-Limonen, Linalool, Zimtalkohol, Citronellol und Geraniol. Neo-angin forte, Lutschtabletten enthalten einen Duftstoff mit den Allergenen Citral, D-Limonen, und Linalool. Diese Substanzen können allergische Reaktionen hervorrufen. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf neo-angin während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, den Apotheker oder den Drogisten bzw. die Ärztin, die Apothekerin oder die Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie neo-angin?

neo-angin junior: Kinder ab 6 Jahre alle 1 bis 2 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen. **neo-angin:** Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren alle 1 bis 2 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen. **neo-angin forte / forte orange:** Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle 1 bis 3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen. Eine Tagesdosis von 12 Lutschtabletten darf nicht überschritten werden. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann neo-angin haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Einnahme von neo-angin auftreten: Ein übermässiger oder längerer Gebrauch von neo-angin kann lokale Reizerscheinungen hervorrufen. Im Falle von frischen Verletzungen im Mund besteht die Gefahr von Blutungen. *Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Behandelten)* Es kann zu einer Veränderung der Geschmackswahrnehmung oder zu einem Taubheitsgefühl der Zunge kommen. *Sehr selten (betrifft weniger als 1 von 10'000 Behandelten)* Es kann zu Überempfindlichkeitsreaktionen oder Sensibilisierungen im Mundbereich kommen. Diese Effekte bilden sich in der Regel kurzfristig zurück. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Halbbarkeit: Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. **Lagerungshinweis:** Bei Raumtemperatur (15–25°C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in neo-angin enthalten?

1 Lutschtablette enthält:

Wirkstoffe: **neo-angin junior:** 1.0 mg Cetylpyridiniumchlorid; 1.0 mg Lidocainhydrochlorid-Monohydrat. – **neo-angin:** 1.25 mg Cetylpyridiniumchlorid; 1.23 mg Lidocainhydrochlorid-Monohydrat. – **neo-angin forte:** 1.25 mg Cetylpyridiniumchlorid; 2.47 mg Lidocainhydrochlorid-Monohydrat. – **neo-angin forte orange:** 1.25 mg Cetylpyridiniumchlorid; 2.47 mg Lidocainhydrochlorid-Monohydrat.

Hilfsstoffe: **neo-angin junior:** Isomalt (E 953), Ascorbinsäure, Weinsäure, Orangenaroma (enthält Citral, Linalool, D-Limonen), Aprikosenaroma (enthält Citral, Linalool, Benzylbenzoat, Benzylcinnamat, Geraniol, D-Limonen, Ethanol), Gelborange S (E 110, Azofarbstoff). **neo-angin:** Isomalt (E 953), Ascorbinsäure, Weinsäure, Citronenöl (enthält Citral, D-Limonen, Linalool), Honigaroma (enthält Ethanol, Propylenglycol (E 1520), Zimtalkohol, Citronellol, Geraniol, D-Limonen, Linalool), Chinolingelb (E 104), Ponceau 4R (E 124, Azofarbstoff), Patentblau V (E 131). – **neo-angin forte:** Isomalt (E 953), Ascorbinsäure, Weinsäure, Levomenthol, Citronenöl (enthält Citral, D-Limonen, Linalool). – **neo-angin forte orange:** Isomalt (E 953), Ascorbinsäure, Weinsäure, Orangenaroma (enthält Citral, Linalool, D-Limonen), Aprikosenaroma (enthält Citral, Linalool, Benzylbenzoat, Benzylcinnamat, Geraniol, D-Limonen, Ethanol), Gelborange S (E 110, Azofarbstoff).

Zulassungsnummer

57'618 (Swissmedic) / 57'625 (Swissmedic) / 57'622 (Swissmedic) / 62'654 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie neo-angin? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen: neo-angin junior: 24 Lutschtabletten / neo-angin: 24 Lutschtabletten / neo-angin forte: 24 Lutschtabletten / neo-angin forte orange: 24 Lutschtabletten

Zulassungsinhaber

Doetsch Grether AG, Basel – Diese Packungsbeilage wurde im November 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

FR Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte et neo-angin forte orange

Qu'est-ce que neo-angin et quand doit-il être utilisé?

Les pastilles neo-angin associent les principes actifs cétypyridine et lidocaïne. Alors que la cétypyridine est responsable des effets bactéricides des pastilles, la lidocaïne calme les douleurs des muqueuses buccales, pharyngées et laryngées. neo-angin est utilisé en traitement d'appoint des inflammations de la sphère bucco-pharyngée, ainsi que du larynx, pour le traitement symptomatique des douleurs lors de la déglutition et en cas d'enrouement. neo-angin peut également être utilisé sur prescription médicale après des interventions dentaires ou chirurgicales.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Remarque pour les personnes diabétiques: Ces médicaments contiennent 2.5 g d'hydrates de carbone digestibles par pastille et sont adaptés pour les personnes diabétiques.

Quand neo-angin ne doit-il pas être utilisé?

Chez les patients avec une hypersensibilité connue à l'un des composants ou à d'autres anesthésiques locaux. Chez les patients hypersensibles aux colorants azoïques, à l'acide acétylsalicylique ainsi qu'aux antirhumatismaux et aux analgésiques (inhibiteurs des prostaglandines).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de neo-angin?

En cas de plaies hémorragiques des muqueuses, les pastilles – pour autant que ce soit nécessaire – doivent être prises avec prudence, car la résorption des principes actifs dans le sang peut être augmentée. Ceci concerne en particulier les patients présentant des troubles cardiovasculaires ou une tendance aux crampes. En cas d'insuffisance hépatique et/ou rénale, car ces restrictions peuvent entraîner une augmentation des concentrations des principes actifs dans le sang. neo-angin forte n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 12 ans. neo-angin et neo-angin junior ne sont pas recommandés chez les enfants de moins de 6 ans. Veuillez consulter un médecin en cas de fièvre élevée ou si aucune amélioration n'est visible après 3 jours. **Excipients :** neo-angin junior, neo-angin forte orange et neo-angin, pastilles contiennent des colorants azoïques qui peuvent provoquer des réactions allergiques (voir aussi «Quand neo-angin ne doit-il pas être pris?»). neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte et neo-angin forte orange, pastilles contiennent de l'isomalt. Prenez neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte et neo-angin forte orange seulement en concertation avec votre médecin, si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre. La valeur calorique est de 2.3 kcal/g d'isomalt. neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte et neo-angin forte orange, pastilles peuvent avoir un effet légèrement laxatif en cas de prise plusieurs fois par jour. neo-angin junior, neo-angin, et neo-angin forte orange, pastilles contiennent de l'alcool (éthanol). La faible teneur en alcool dans ces médicaments n'a pas de conséquences perceptibles. En cas de peau endommagée, cela peut provoquer une sensation de brûlure. neo-angin junior et neo-angin forte orange, pastilles contiennent du parfum avec les allergènes citral, linalol, d-limonène, benzoate de benzyle, cinnamate de benzyle et du géraniol. neo-angin, pastilles contiennent du parfum avec les allergènes citral, d-limonène, linalol, alcool cinnamique, citronellol et géraniol. neo-angin forte, pastilles contiennent du parfum avec les allergènes citral, d-limonène et linalol. Ces substances peuvent provoquer des réactions allergiques. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication) !

neo-angin peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser neo-angin?

neo-angin junior : Enfants dès 6 ans : laisser fondre une pastille lentement dans la bouche toutes les 1 à 2 heures. *neo-angin* : Adultes et enfants dès 6 ans : laisser fondre une pastille lentement dans la bouche toutes les 1 à 2 heures. *neo-angin forte / forte orange* : Adultes et adolescents dès 12 ans : laisser fondre une pastille lentement dans la bouche toutes les 1-3 heures. La dose quotidienne de 12 pastilles ne doit pas être dépassée. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires neo-angin peut-il provoquer?

La prise de neo-angin peut provoquer les effets secondaires suivants: Une utilisation excessive ou prolongée de neo-angin peut entraîner des réactions locales d'irritation. Un risque d'hémorragie existe en cas de plaie récente dans la bouche. *Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)* Une modification de la perception gustative ou une sensation d'engourdissement au niveau de la langue peut apparaître. *Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)* Des réactions d'ipersensibilité ou des sensibilisations peuvent apparaître dans la sphère buccale. En général, ces effets disparaissent rapidement. Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité : Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage. *Remarques concernant le stockage* : Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de la portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient neo-angin?

1 pastille contient:

Principes actifs : *neo-angin junior* : 1,0 mg de chlorure de cétalpyridinium; 1,0 mg de chlorhydrate de lidocaïne monohydraté. – *neo-angin* : 1,25 mg de chlorure de cétalpyridinium; 1,23 mg de chlorhydrate de lidocaïne monohydraté. – *neo-angin forte* : 1,25 mg de chlorure de cétalpyridinium; 2,47 mg de chlorhydrate de lidocaïne monohydraté. – *neo-angin forte orange* : 1,25 mg de chlorure de cétalpyridinium; 2,47 mg de chlorhydrate de lidocaïne monohydraté. *Excipients* : *neo-angin junior*: isomalt (E 953), acide ascorbique, acide tartrique, arôme orange (contient du citral, linalol, d-limonène), arôme d'abricot (contient du citral, linalol, benzoate de benzyle, cinnamate de benzyle, géraniol, d-limonène, éthanol), jaune orangé S (E 110, colorant azoïque). – *neo-angin*: isomalt (E 953), acide ascorbique, acide tartrique, huile de citron (contient du citral, d-limonène, linalol), arôme de miel (contient de l'éthanol, propylène glycol (E 1520), alcool cinnamique, citronellol, géraniol, d-limonène, linalol), jaune de quinoléine (E 104), Ponceau 4R (E 124, colorant azoïque), bleu patenté V (E 131). – *neo-angin forte* : isomalt (E 953), acide ascorbique, acide tartrique, lévomenthol, huile de citron (contient du citral, d-limonène, linalol). – *neo-angin forte orange* : isomalt (E 953), acide ascorbique, acide tartrique, arôme orange (contient du citral, linalol, d-limonène), arôme d'abricot (contient du citral, linalol, benzoate de benzyle, cinnamate de benzyle, géraniol, d-limonène, éthanol), jaune orangé S (E 110, colorant azoïque).

Numéro d'autorisation

57'618 (Swissmedic) / 57'625 (Swissmedic) / 57'622 (Swissmedic) / 62'654 (Swissmedic)

Où obtenez-vous neo-angin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages : *neo-angin junior* : 24 pastilles. / *neo-angin* : 24 pastilles. / *neo-angin forte* : 24 pastilles. / *neo-angin forte orange* : 24 pastilles.

Titulaire de l'autorisation

Doetsch Grether SA, Bâle – Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

IT Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il massimo beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte e neo-angin forte orange

Che cos'è neo-angin e quando si usa?

Le pastiglie neo-angin contengono un'associazione dei principi attivi cetilpiridinio e lidocaina. Mentre il cetilpiridinio è responsabile dell'effetto antisettico delle pastiglie, la lidocaina allevia i dolori della mucosa del cavo orale, della faringe e della laringe. neo-angin è utilizzato per favorire la guarigione nelle infiammazioni del cavo orale e/o della faringe e della laringe, come pure per il trattamento sintomatico dei dolori nella deglutizione e in caso di raucedine. neo-angin può essere assunto dietro prescrizione medica anche dopo interventi dentistici o chirurgici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Indicazione per i diabetici: Questi medicamenti contengono 2,5 g di carboidrati digeribili per pastiglia e sono med-translationstti ai diabetici.

Quando non si può usare neo-angin?

In caso di pazienti con ipersensibilità nota verso uno dei componenti o verso altri anestetici locali. In caso di pazienti ipersensibili alle sostanze coloranti azoiche, agli acidi acetilsalicilici nonché ad antireumatici e analgesici (inibitori di prostaglandina).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di neo-angin?

In caso di ferite sanguinanti nella mucosa, le pastiglie devono essere assunte con prudenza e solo se necessario, poiché l'assimilazione del principio attivo nel sangue può essere aumentata. Ciò vale in particolare nel caso di pazienti con disturbi cardiocircolatori o tendenza ad avere crampi. In caso di ridotta funzionalità epatica e/o renale, poiché queste riduzioni possono portare a una maggiore concentrazione del principio attivo nel sangue. neo-angin forte non è consigliato per bambini sotto i 12 anni. neo-angin e neo-angin Junior non è consigliato per bambini sotto i 6 anni. In caso di febbre alta o se non si verifica alcun miglioramento entro 3 giorni bisogna rivolgersi al medico.

Sostanze ausiliarie: Neo-angin junior, neo-angin forte orange e neo-angin pastiglie contengono coloranti azoici, che possono causare delle reazioni allergiche (cfr. anche «Quando non si può usare neo-angin?»). Neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte e neo-angin forte orange pastiglie contengono isomalto. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte e neo-angin forte orange pastiglie. Il valore calorico è di 2,3 kcal/g di isomalto. Neo-angin junior, neo-angin, neo-angin forte e neo-angin forte orange pastiglie possono avere un lieve effetto lassativo, se vengono assunti più volte al giorno. Neo-angin junior, neo-angin e neo-angin forte orange pastiglie contengono alcol (etanolo). La piccola quantità di alcol in questi medicamenti non produrrà effetti rilevanti. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata. Neo-angin junior e neo-angin forte orange pastiglie contengono un aroma a sua volta contenente gli allergeni citrale, linalolo, D-limonene, benzile benzoato, benzile cinnamato e geraniolo. Neo-angin pastiglie contiene un aroma a sua volta contenente gli allergeni citrale, D-limonene, linalolo, alcol di cannella, citronellolo e geraniolo. Neo-angin forte pastiglie contiene un aroma a sua volta contenente gli allergeni citrale, D-limonene e linalolo. Queste sostanze possono causare reazioni allergiche. Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applica altri medicamenti (anche se acquistati da sua iniziativa).

Si può somministrare neo-angin durante la gravidanza o l'allattamento?

Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti

durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare neo-angin?

neo-angin junior: Bambini dai 6 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 1-2 ore. *neo-angin*: Adulti e bambini dai 6 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 1-2 ore. *neo-angin forte / forte orange*: Adulti e ragazzi dai 12 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 1-3 ore. Non superare la dose giornaliera di 12 pastiglie. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere neo-angin?

In seguito all'assunzione di neo-angin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: neo-angin se usato in dosi elevate e per lungo tempo, può portare a delle irritazioni locali. In caso di ferite fresche in bocca, sussiste il pericolo di emorragie. *Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)* Si può arrivare a una modificazione della percezione del gusto o a una sensazione di intorpidimento della lingua. *Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)*. Possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità o sensibilizzazioni nell'area della bocca. Di regola questi effetti regrediscono in breve tempo. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità: Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con „EXP“ sul contenitore. *Istruzioni di conservazione*: Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) e fuori della portata dei bambini. Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene neo-angin?

1 pastiglia contiene:

Principi attivi: *neo-angin junior*: 1,0 mg di cetilpiridinio cloruro; 1,0 mg di lidocaina cloridrato monoidrato. – *neo-angin*: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 1,23 mg di lidocaina cloridrato monoidrato. – *neo-angin forte*: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 2,47 mg di lidocaina cloridrato monoidrato. – *neo-angin forte orange*: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 2,47 mg di lidocaina cloridrato monoidrato.

Sostanze ausiliarie: *neo-angin junior*: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, aroma di arancia (contiene citrale, linalolo, D-limonene), aroma di albicocca (contiene citrale, linalolo, benzile benzoato, benzile cinnamato, geraniolo, D-limonene, etanolo), giallo arancione S (E 110, colorante azoico). – *neo-angin*: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, limone essenza (contiene citrale, D-limonene, linalolo), aroma di miele (contiene etanolo, glicole propilenico (E 1520), alcol di cannella, citronellolo, geraniolo, D-limonene, linalolo), giallo di chinolina (E 104), Ponceau 4R (E 124, colorante azoico), blu patentato V (E 131). – *neo-angin forte*: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, levomentolo, limone essenza (contiene citrale, D-limonene, linalolo). – *neo-angin forte orange*: isomalto (E 953), acido ascorbico, acido tartarico, aroma di arancia (contiene citrale, linalolo, benzile benzoato, benzile cinnamato, geraniolo, D-limonene, etanolo), giallo arancione S (E 110, colorante azoico).

Numero dell'omologazione

57'618 (Swissmedic) / 57'625 (Swissmedic) / 57'622 (Swissmedic) / 62'654 (Swissmedic)

Dove è ottenibile neo-angin? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Confezioni: neo-angin junior: 24 pastiglie / neo-angin: 24 pastiglie / neo-angin forte: 24 pastiglie / neo-angin forte orange: 24 pastiglie

Titolare dell'omologazione

Doetsch Grether SA, Basilea – Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).