

## **Foglietto illustrativo**

**neo-angin® junior pastiglie per la gola**

**neo-angin® pastiglie per la gola**

**neo-angin® forte / forte orange pastiglie per la gola**

### **Che cos'è neo-angin e quando si usa?**

Le pastiglie per la gola neo-angin contengono un'associazione dei principi attivi cetilpiridinio e lidocaina.

Mentre il cetilpiridinio è responsabile dell'effetto antisettico delle pastiglie da sciogliere in bocca, la lidocaina allevia i dolori della mucosa del cavo orale, della faringe e della laringe.

neo-angin è utilizzato per favorire la guarigione nelle infiammazioni del cavo orale e/o della faringe e della laringe, come pure per il trattamento sintomatico dei dolori nella deglutizione e in caso di raucedine.

neo-angin può essere assunto dietro prescrizione medica anche dopo interventi dentistici o chirurgici.

### **Quando non si può usare neo-angin?**

In caso di pazienti con ipersensibilità nota verso uno dei componenti o verso altri anestetici locali. In caso di pazienti ipersensibili alle sostanze coloranti azoiche, agli acidi acetilsalicilici nonché ad antireumatici e analgesici (inibitori di prostaglandina).

### **Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di neo-angin?**

In caso di ferite sanguinanti nella mucosa, le pastiglie per la gola devono essere assunte con prudenza e solo se necessario, poiché l'assimilazione del principio attivo nel sangue può essere aumentata. Ciò vale in particolare nel caso di pazienti con disturbi cardiocircolatori o tendenza ad avere crampi.

In caso di ridotta funzionalità epatica e/o renale, poiché queste riduzioni possono portare a una maggiore concentrazione del principio attivo nel sangue.

neo-angin forte non è consigliato per bambini sotto i 12 anni. neo-angin e neo-angin Junior non è consigliato per bambini sotto i 6 anni.

In caso di febbre alta o se non si verifica alcun miglioramento entro 3 giorni bisogna rivolgersi al medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

### **Si può somministrare neo-angin durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino, se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Come usare neo-angin?**

neo-angin junior: Bambini dai 6 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia per la gola ogni 1-2 ore.

neo-angin: Adulti e bambini dai 6 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia per la gola ogni 1-2 ore.

neo-angin forte/forte orange: Adulti e ragazzi dai 12 anni in su: sciogliere lentamente in bocca una pastiglia per la gola ogni 1-3 ore. Non superare la dose giornaliera di 12 pastiglie.

Le pastiglie per la gola sono adatte anche per i diabetici.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

#### **Quali effetti collaterali può avere neo-angin?**

In seguito all'assunzione di neo-angin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

neo-angin se usato in dosi elevate e per lungo tempo, può portare a delle irritazioni locali. In caso di ferite fresche in bocca, sussiste il pericolo di emorragie.

Raramente si può arrivare a una modificazione della percezione del gusto o a una sensazione di intorpidimento della lingua.

Molto raramente possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità o sensibilizzazioni nell'area della bocca. Di regola questi effetti regrediscono in breve tempo.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

#### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori della portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

#### **Che cosa contiene neo-angin?**

1 pastiglia per la gola neo-angin junior contiene: Principi attivi: 1,0 mg di cetilpiridinio cloruro; 1,0 mg di lidocaina idrocloruro. Eccipienti: isomalt, coloranti (E110), aromi e altri eccipienti.

1 pastiglia per la gola neo-angin contiene: Principi attivi: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 1,23 mg di lidocaina idrocloruro. Eccipienti: isomalt, coloranti (E104, E124, E131), aromi e altri eccipienti.

1 pastiglia per la gola neo-angin forte contiene: Principi attivi: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 2,47 mg di lidocaina idrocloruro. Eccipienti: isomalt, aromi e altri eccipienti.

1 pastiglia per la gola neo-angin forte orange contiene: Principi attivi: 1,25 mg di cetilpiridinio cloruro; 2,47 mg di lidocaina idrocloruro. Eccipienti: isomalt, colorante (E110), aroma: vanillina e altri aromi, come pure altri eccipienti.

**Numero dell'omologazione** 57618, 57625, 57622, 62654 (Swissmedic).

#### **Dov'è ottenibile neo-angin? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

**Confezioni** neo-angin junior / neo-angin / neo-angin forte / neo-angin forte orange: 24 pastiglie per la gola.

**Titolare dell'omologazione** Doetsch Grether AG, Basilea.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2016 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).